

Mi Elección de Anestesia: Anestesia raquídea o general para cirugía de una fractura de cadera






Febrero de 2024









Si necesita cirugía de una fractura de cadera, necesitará anestesia durante la cirugía.

Esta guía le ayudará a usted y a su médico a elegir entre la anestesia raquídea y la anestesia general. Ambas opciones le permiten estar cómodo durante la cirugía. Su médico le vigilará todo el tiempo.

¿En qué se diferencian la anestesia raquídea y la anestesia general?

	Anestesia raquídea	Anestesia general
 En qué consiste	<ul style="list-style-type: none">Una inyección en la espalda para adormecer la articulación de la cadera y las piernas y evitar así el dolorMedicamentos para que se sienta relajado durante la cirugíaEstará consciente (despierto) durante la cirugía	<ul style="list-style-type: none">Medicamentos para mantenerle inconsciente (dormido) e incapaz de sentir dolor durante la cirugíaUn tubo a través de su boca para ayudarle a respirar, el cual se retira cuando usted despierte
 Para quién es menos seguro	Puede ser menos seguro para las personas que toman anticoagulantes	Puede ser menos seguro para personas con problemas pulmonares importantes
 Efecto secundario: Escalofríos	Alrededor de 6 de cada 100 personas tienen escalofríos incómodos hasta 3 días después de la cirugía	Alrededor 3 de cada 100 personas tienen escalofríos incómodos hasta 3 días después de la cirugía
 Efecto secundario: Dolor de garganta	Alrededor 2 de cada 100 personas tienen dolor de garganta unos días después de la cirugía	Alrededor 5 de cada 100 personas tienen dolor de garganta unos días después de la cirugía
 Efecto secundario: Problema de salud por la anestesia	Alrededor de 13 de cada 100 personas sufren una infección pulmonar o un problema renal a causa de la anestesia	Alrededor 15 de cada 100 personas sufren una infección pulmonar o un problema renal a causa de la anestesia

¿En qué se parecen la anestesia raquídea y la anestesia general?

 Dolor: Nivel de dolor los 3 primeros días después de la cirugía	No hay diferencia en la cantidad de dolor que se siente en los 3 primeros días después de la cirugía
 Recuperación: Salir del hospital	La mayoría de las personas salen del hospital alrededor de tres días después la cirugía
 Recuperación: A dónde va la gente después de salir del hospital	Alrededor de 26 de cada 100 personas se van directamente a la casa, mientras que el resto se van a un centro de rehabilitación durante algunos días antes de irse a la casa
 Efecto secundario: Confusión	Alrededor 20 de cada 100 personas se sienten confusas durante unos días o semanas después de la cirugía
 Recuperación: Caminar por su cuenta 2 meses después de la cirugía	Alrededor de 82 de cada 100 personas son capaces de caminar por sí mismas dos meses después de la cirugía
 Costo	El costo para usted debería ser aproximadamente el mismo. Consulte a su seguro o al hospital.