






# Mi Elección de Anestesia: Anestesia raquídea o general para cirugía de una fractura de cadera

Si necesita cirugía de una fractura de cadera, necesitará anestesia durante la cirugía. Esta guía le ayudará a usted y a su médico a elegir entre la anestesia raquídea y la anestesia general.








Julio de 2024



## ¿En qué se diferencian la anestesia raquídea y la anestesia general?

	<b>Anestesia raquídea</b>	<b>Anestesia general</b>
 <b>En qué consiste</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Una inyección en la espalda para adormecer la articulación de la cadera y las piernas durante unas horas. No sentirá dolor ni podrá mover las piernas.</li><li>Medicamentos por vía intravenosa para que se sienta relajado durante la cirugía</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Medicamentos para mantenerle inconsciente (dormido) e incapaz de sentir dolor durante la cirugía</li><li>Un tubo para ayudarle a respirar, el cual se retira cuando usted despierte</li></ul>
 <b>Para quién es menos seguro</b>	Puede ser menos seguro para las personas que toman anticoagulantes	Puede ser menos seguro para personas con problemas pulmonares importantes
 <b>Efecto secundario:</b> Escalofríos	Alrededor de 6 de cada 100 personas tienen escalofríos incómodos después de la cirugía	Alrededor de 3 de cada 100 personas tienen escalofríos incómodos después de la cirugía
 <b>Efecto secundario:</b> Dolor de garganta	Alrededor de 2 de cada 100 personas tienen dolor de garganta después de la cirugía	Alrededor de 5 de cada 100 personas tienen dolor de garganta después de la cirugía, probablemente por el tubo que le ayuda a respirar
 <b>Efecto secundario:</b> Problema de salud (complicación)	Alrededor de 13 de cada 100 personas tienen un problema de salud leve o grave después de la cirugía	Alrededor de 15 de cada 100 personas tienen un problema de salud leve o grave después de la cirugía

## ¿En qué se parecen la anestesia raquídea y la anestesia general?

 <b>Durante la cirugía</b>	Ambas opciones le permiten estar cómodo durante la cirugía. Su médico le vigilará todo el tiempo.
 <b>Dolor:</b> Dolor después de la cirugía	No hay diferencia en la cantidad de dolor que se siente en los 3 primeros días después de la cirugía
 <b>Recuperación:</b> Salir del hospital	La mayoría de las personas salen del hospital alrededor de 3 días después de la cirugía
 <b>Recuperación:</b> A dónde va la gente después de salir del hospital	Alrededor de 26 de cada 100 personas se van directamente a la casa, mientras que el resto se van a un centro de rehabilitación durante algunos días antes de irse a la casa
 <b>Efecto secundario:</b> Confusión	Alrededor de 20 de cada 100 personas se sienten confusas durante unos días o semanas después de la cirugía
 <b>Recuperación:</b> Caminar por su cuenta	Alrededor de 82 de cada 100 personas son capaces de caminar por sí mismas 2 meses después de la cirugía
 <b>Costo</b>	El costo para usted debería ser aproximadamente el mismo. Consulte a su seguro o al hospital.

**Escanea el código QR o visite  
MyAnesthesiaChoice.com para ver los datos  
utilizados para desarrollar esta herramienta.**

